



PREPARACIÓN PARA TEST DE AIRE ESPIRADO PARA DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI PROCEDIMIENTOS A REALIZAR POR LA MAÑANA

DEBE ASISTIR CON **6 HS. DE AYUNO**, PREFERIBLEMENTE DESDE LA NOCHE ANTERIOR.

El tratamiento antibiótico para la erradicación del H. Pylori puede dar lugar a resultados falsos negativos. Por consiguiente, el test se realizará después de, al menos, 4 semanas sin terapia antibiótica sistémica y 4 semanas después de la última dosis de agentes anti secretores ácidos como inhibidores de la bomba de protones (Ej. Omeprazol, Lanzoprazol, Pantoprazol, Esomeprazol, etc.).

Puede reemplazar dicho tratamiento con antiácidos (Ej. Mylanta) y/o ranitidina (Ej. Taural)

Procedimiento:

- 1- Se le administrará para ingerir una bebida rica en ácido cítrico
- 2- A los 10 minutos se le tomarán dos muestras (consiste en soplar en un tubo)
- 3- Se le administrará para ingerir una solución de urea diluida
- 4- A los 30 minutos se le tomarán dos muestras (consiste en soplar en un tubo)

El procedimiento dura 40 minutos.